Progetto comunitario prepAIR: la qualità dell'aria nel bacino padano

Martedì 24 novembre 2020 ore 10:00

REALIZZATO DA:

Programma

Parte prima

**Qualità dell'Aria in Friuli Venezia Giulia nel contesto del
progetto EU LIFE-PREPAIR**

A cura di Fulvio Stel

Parte seconda

PREPAIR: emissioni, scenari, valutazioni

A cura di Giovanni Bonafè

Qualità dell'Aria in Friuli Venezia Giulia nel contesto del progetto EU LIFE-PREPAIR

www.lifeprepair.eu

Arpa FVG – feat Fulvio Stel

Inquinamento Atmosferico o Qualità dell'Aria?

Inquinamento Atmosferico:

**Ogni forma di
perturbazione dello stato
naturale dell'atmosfera**

Qualità dell'Aria

**Condizioni nelle quali si
trova l'atmosfera che
respiriamo**

La qualità dell'aria (con i suoi standard) è regolamentata da una Direttiva Europea (2008/50/CE; fissa obiettivi e le modalità di valutazione)

Inquinamento Atmosferico o Qualità dell'Aria?

Direttiva Europea:

2008/50/CE

(tradotta nel D.lgs 155/2010)

**Misuriamo dappertutto le stesse «cose»
e lo facciamo allo stesso modo**

**«norma» (fissa delle
soglie) per alcuni
inquinanti, non per tutti
(**PM10, O3, SO2, ...**)**

**Regolamenta le modalità
di monitoraggio (quali e
quanti punti di misura,
dove, con quale
frequenza, etc.**

Inquinamento Atmosferico o Qualità dell'Aria?

Direttiva Europea:

2008/50/CE

(tradotta nel D.lgs 155/2010)

**Agiamo in maniera diversa a seconda
delle diversità dei territori**

**Prescrive che la
valutazione della qualità
dell'aria sia fatta per
tutto il territorio**

**Individua in maniera
chiara le responsabilità
(Stato, Regioni, Comuni)
e prescrive cosa fare
(**Piani Qualità dell'Aria**)**

Inquinamento Atmosferico o Qualità dell'Aria?

19/02/2019

Regolamenta le modalità di monitoraggio (quali e quanti punti di misura, dove, etc.)

Inquinamento Atmosferico o Qualità dell'Aria?

Qualità dell'aria e «clima chimico» dell'atmosfera

3200 anni a.C.

I polmoni di Oetzi (la mummia del Similaun) sono abbondantemente incrostati di depositi di polveri carboniose.

Oetzi morì a ca. 40 anni di morte violenta, se fosse vissuto sino a 60-80 anni, avrebbe certamente sviluppato delle patologie mortali ricollegabili all'inquinamento atmosferico

Qualità dell'aria e «clima chimico» dell'atmosfera

CO media annuale

SO₂ media annuale

O₃ media annuale

Alcuni inquinanti sono virtualmente scomparsi o sono in rapida diminuzione...

Qualità dell'aria e «clima chimico» dell'atmosfera

PM10 (concentrazione media annua)

...ma alcuni inquinanti ancora rimangono a livelli significativi e tali da abbassare la qualità complessiva dell'aria. Come mai?

O3 estivo (media aprile-settembre)

Qualità dell'aria e «clima chimico» dell'atmosfera

Siamo stati molto bravi a ridurre gli inquinanti che:

- 1) Avevano un'unica sorgente;
- 2) Hanno consentito una soluzione tecnologica del problema.

Stiamo faticando molto a ridurre gli inquinanti che:

- 1) Hanno sorgenti multiple;
- 2) Richiedono una modifica nel comportamento delle persone (scelte).

Ma tornando a noi...

**Quali sono i problemi della Qualità dell'Aria
in Friuli Venezia Giulia?**

Com'è la Qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia?

Ozono (O3)

Superamenti giornalieri 2019

Di cosa è fatto l'ozono?

Di cosa è fatto l'ozono?

Di cosa è fatto l'ozono?

Precursori dell'ozono (inemar 2015)

5000 t/anno Produzione energia e trasformazione combustibili;

9300 t/anno Combustione nell'industria e processi produttivi;

17000 t/anno Trasporto su strada;

10000 t/anno Solventi;

36000 t/anno Foreste;

....

Com'è la Qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia?

Materiale Particolato PM10

Superamenti giornalieri 2019

Di cosa è fatto il particolato?

Fonte: progetto EU iMONITRAF!

Com'è la Qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia?

Benzo[a]pirene

Com'è la Qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia?

Benzo[a]pirene

Com'è la Qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia?

Benzo[a]pirene

Il tracciante **levoglucosano** indica la sorgente «**combustione legna**» come sorgente del **benzoapirene**

Perché il progetto LIFE - PREPAIR

**Fornire strumenti condivisi per la predisposizione dei Piani di Qualità dell'Aria
(cfr. presentazione successiva)**

**Affrontare in maniera multisorgente il tema della qualità dell'aria
(quattro pillars: Energia, Biomasse, Trasporti, Agricoltura)**

**Fornire esperienze per il cambiamento dei comportamenti
(corsi di formazione)**

....

Grazie per l'Attenzione

(il futuro è più facile crearlo che prevederlo)

PREPAIR: emissioni, scenari, valutazioni

Le principali sorgenti emissive associate agli inquinanti ancora problematici nel bacino padano individuate per tipologia e collocazione spaziale

Giovanni Bonafè, Edi Baiutti, Marco Bellini, Irene Gallai,
Andrea Mistaro, Francesco Montanari, Alessia Movia,
Alessandra Petrini, Fulvio Stel, Arianna Tolloi, Marco Visintin
Centro Regionale di Modellistica Ambientale
SOS Qualità dell'Aria
IPAS Analisi chimiche ambientali

schema DPSIR

processi, scale spaziali, scale temporali

emissioni nel bacino padano: mappe, tendenze

il supporto alla stesura di un piano per la qualità dell'aria

scenari emissivi

scenari di qualità dell'aria

attribuzione geografica alle sorgenti

attribuzione settoriale alle sorgenti: panoramica regionale

attribuzione settoriale alle sorgenti: dettaglio comunale

indicatori meteo

primavera 2020: effetti del *lockdown*

schema DPSIR

Determinanti numero di industrie, numero di veicoli, stili di vita, ...

Pressioni emissioni di inquinanti

Stato concentrazioni di inquinanti in aria, deposizioni

Impatti patologie, riduzione della produttività agricola, danni ad ecosistemi, ...

Determinanti

Pressioni

Determinanti

Pressioni

Stato

Determinanti

Pressioni

Stato

Impatti

Risposte

Determinanti

Pressioni

Stato

Impatti

Risposte → **Determinanti** misure/azioni non-tecnologiche di mitigazione

Risposte → **Pressioni** misure/azioni tecnologiche di mitigazione

Risposte → **Impatti** misure/azioni di adattamento

Esempi:

Risposte → **Determinanti** misure/azioni non-tecnologiche di mitigazione

Risposte → **Pressioni** misure/azioni tecnologiche di mitigazione

Risposte → **Impatti** misure/azioni di adattamento

Esempi:

Risposte → **Determinanti** usare i mezzi di trasporto pubblici, coibentare gli edifici, ...

Risposte → **Pressioni** sostituire la vecchia stufa, sostituire l'auto, ...

Risposte → **Impatti** evitare le zone più inquinate, evitare di uscire nelle giornate più inquinate, ...

processi, scale spaziali, scale
temporali

emissioni $\neq$ concentrazioni

emissioni $\neq$ concentrazioni

- il rispetto dei limiti delle emissioni non garantisce automaticamente il rispetto dei limiti delle concentrazioni
- il rispetto dei limiti delle concentrazioni non garantisce automaticamente la tutela della salute e dell'ambiente

primari $\neq$ secondari $\neq$ precursori

quesito 1

come si chiamano gli inquinanti che si formano in atmosfera per effetto di combinazioni e trasformazioni di altre specie chimiche?

- 1) primari
- 2) secondari
- 3) precursori

componente

hot-spot

fondo urbano

fondo regionale

scala temporale

~minuti

~ore

~giorni

figura da: [Seinfeld and Pandis, 2016]

particolato grossolano $\neq$ p. fine $\neq$ p. ultrafine

quesito 2

quale tra le seguenti taglie di particolato atmosferico si **deposita** più rapidamente?

- 1) grossolano
- 2) fine
- 3) ultrafine

quesito 2

quale tra le seguenti taglie di particolato atmosferico si **deposita** più rapidamente?

- 1) grossolano
- 2) fine
- 3) ultrafine

quesito 3

quale tra le seguenti taglie di particolato atmosferico si **trasforma** rapidamente in qualcos'altro?

- 1) grossolano
- 2) fine
- 3) ultrafine

emissioni nel bacino padano: mappe, tendenze

Emission share on base year 2013 for Po-basin	NH3	NMVOC	NMVOC without mac 10 and 11	NOx	PM10
1-Combustion in energy and transformation industries	0%	0%	0%	6%	1%
2-Non-industrial combustion plants	0%	5%	11%	9%	56%
3-Combustion in manufacturing industry	0%	1%	2%	15%	4%
4-Production processes	0%	4%	9%	3%	3%
5-Extraction and distribution of fossil fuels and geothermal energy	0%	2%	4%	0%	0%
6-Solvent and other product use	0%	28%	58%	0%	5%
7-Road transport	1%	6%	14%	50%	20%
8-Other mobile sources and machinery	0%	1%	2%	13%	4%
9-Waste treatment and disposal	1%	0%	0%	1%	0%
10-Agriculture	97%	22%	0%	1%	4%
11-Other sources and sinks	0%	31%	0%	0%	3%
Total Emissions	100%	100%	100%	100%	100%

2013 Year Emissions of NOx

2013 Year Emissions of PM₁₀

2013 Year Emissions of NH₃

2013 Year Emissions of NMVOC (without sectors 10 and 11)

video 1

<https://youtu.be/N4qU61npgK8>

il supporto alla stesura di un piano per la qualità dell'aria

Schema semplificato delle differenti fasi di un piano di qualità dell'aria (AQP)²

²[Miranda et al., 2014]

scenari emissivi	quali sono le tendenze attese per le emissioni del 2025?...
scenari QA	...e come cambierà di conseguenza la qualità dell'aria?
attribuzione spaziale	da quali territori provengono gli inquinanti che impattano su FVG?
attribuzione settoriale	su quali settori è più efficace intervenire per ridurre le concentrazioni?
indicatori meteo	variabili riferite a dispersione/accumulo locali

scenari emissivi	progetto PREPAIR: inventari regionali e nazionali, scenari CLE e AQP al 2025
scenari QA	progetto PREPAIR: simulazioni Nord Italia e Slovenia, catena COSMO+CHIMERE
attribuzione spaziale	SHERPA, <i>tool</i> del JRC calibrato con simulazioni CHIMERE di scala continentale
attribuzione settoriale	<i>Brute Force Method</i> , simulazioni di scala regionale con catena WRF+FARM
indicatori meteo	catena WRF+GAP+SURFPRO: statistiche su indicatori di ricircolo, stagnazione e ventilazione

scenari emissivi

scenari di qualità dell'aria

biossido di azoto

media annua

PM10

media annua

PM10

superamenti giornalieri

PM2.5 media annua

OZONO

superamenti giornalieri

attribuzione geografica alle sorgenti

analitico valutazione al recettore

modellistico valutazione alla sorgente

*) $\eta_c = \Delta(I_c) / \Delta(E)$

NO2

PM10

origine:

PM2.5

efficienza* (%)

*) $\eta_c = \Delta(I_c) / \Delta(E)$

attribuzione settoriale alle sorgenti: panoramica regionale

codice	descrizione
Agrcltr	attività agricole (inclusi trasporti, esclusi allevamenti)
CEnergy	produzione di energia
FsFuels	combustibili fossili (estrazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione)
Industr	attività industriali
Livstck	allevamenti
Maritim	attività marittime (porti, pesca)
NIBioms	combustione non industriale di legna e affini (riscaldamento)
NIOther	combustione non industriale (esclusa legna e affini)
OthMobl	altre sorgenti mobili (treni diesel, aeroporti)
RTrFrgt	trasporto di merci su strada
RTrPsng	trasporto di passeggeri su strada
Solvent	uso e stoccaggio di solventi
WastTrD	trattamento e smaltimento di rifiuti

attribuzione alle sorgenti – media annua di NO₂

contributi relativi settoriali, pesati sul FVG con la popolazione

concentrazione 'bassa': inferiore al 66esimo percentile,
concentrazione 'alta': superiore al 90esimo percentile;
'[altro]': settori che danno un contributo < 5%, aggregati

attribuzione alle sorgenti – media annua di PM10

contributi relativi settoriali, pesati sul FVG con la popolazione

concentrazione 'bassa': inferiore al 66esimo percentile,
concentrazione 'alta': superiore al 90esimo percentile;
'[altro]': settori che danno un contributo < 5%, aggregati

attribuzione alle sorgenti – 36° valore giornaliero più elevato di PM10

contributi relativi settoriali, pesati sul FVG con la popolazione

concentrazione 'bassa': inferiore al 66esimo percentile,
concentrazione 'alta': superiore al 90esimo percentile;
'[altro]': settori che danno un contributo < 5%, aggregati

attribuzione alle sorgenti – media annua di PM2.5

contributi relativi settoriali, pesati sul FVG con la popolazione

concentrazione 'bassa': inferiore al 66esimo percentile,
concentrazione 'alta': superiore al 90esimo percentile;
'[altro]': settori che danno un contributo < 5%, aggregati

attribuzione settoriale alle sorgenti: dettaglio comunale

Attribuzione settoriale alle sorgenti per la media annua di biossido di azoto

Attribuzione settoriale alle sorgenti per il 36° valore giornaliero più alto di **PM10**

Attribuzione settoriale alle sorgenti per il 26° valore più alto del massimo giornaliero della media mobile su 8 ore dell'**ozono**

- sul corretto uso delle biomasse per riscaldamento domestico, sulle opportunità per la sostituzione di apparecchi obsoleti, ecc.
<https://www.facebook.com/lifepreparepair/videos/> e
<https://www.facebook.com/events/2304372163042727/>

indicatori meteo

stagnazione identifica condizioni persistenti di vento molto debole nello strato più basso

ricircolo identifica giornate caratterizzate da variabilità della direzione del vento, in particolare brezze

ventilazione identifica il ricambio della massa d'aria nello strato limite atmosferico

stagnazione frazione delle 24 ore in cui $ws < ws_{crit}$, con $ws_{crit} = 2 \text{ m/s}$,
velocità del vento critica oraria³ [Allwine and Whiteman, 1994]

ricircolo

$$R = 1 - \frac{D_{net}}{D_{tot}}$$

con $D_{net} = \sqrt{\sum(u_i^2) + \sum(v_i^2)}$ e $D_{tot} = \sum(ws \cdot \Delta t)$
[Allwine and Whiteman, 1994, Pérez et al., 2014]

ventilazione media giornaliera della ventilazione oraria

$$V_h = \sum_{j=1}^{H_{PBL}} (dH_j \cdot ws_j)$$

[Pasch et al., 2011, Wu et al., 2013]

³soglia scelta arbitrariamente

Per ciascuno dei tre indicatori, in ciascuna cella del dominio ogni giornata viene classificata come “critica” o “non-critica”, a seconda del valore dell’indicatore rispetto ad un valore critico di soglia.

Tali soglie sono definite in base alle distribuzioni degli indicatori, come 25esimo (V_c) o 75esimo (S_c, R_c) percentile, perciò dipendono da modello, dominio e anno.

indicatore	valore critico	condizione di criticità
stagnazione	$S_c = 0.67$	$S > S_c$
ventilazione	$V_c = 700 \text{ m}^2/\text{s}$	$V < V_c$
ricircolo	$R_c = 0.5$	$R > R_c$

In ciascun mese e/o stagione possiamo contare il numero di “giorni critici”.

season: MAM

season: JJA

season: SON

season: DJF

Index Rectic

Index Stagn

Index Ventil

Per facilitare la sintesi
 nelle aree di montagna,
 classifichiamo ciascuna
 cella del dominio di studio
 in base a un indice
 topografico
 [De Reu et al., 2013]

index: recirculation

index: stagnation

landform

- Flat Area
- Ridge
- Sea
- Slope
- Valley

index: ventilation

index: Recirc

index: Stagn

cluster

index: Ventil

Month

primavera 2020: effetti del *lockdown*

video 2

<https://youtu.be/Gq9t8G-5UIw>

Covid-19 e qualità dell'aria nel Bacino Padano

Dati raccolti e metodologia adottata

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

Impatto delle misure di contenimento Covid-19 su emissioni inquinanti

Variazioni delle concentrazioni degli inquinanti

Dati sulla situazione meteorologica

RAPPORTO

Covid-19 e qualità dell'aria nel Bacino Padano

Fasi successive e prospettive

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

2° fase dello studio

Analizzare

le fasi successive del lockdown (aprile-maggio 2020)

Approfondire

dati raccolti e studiare la composizione chimica del particolato (PM_{10})

Fornire elementi utili

a supporto delle politiche di miglioramento della qualità dell'aria e di eventuali studi epidemiologici

Covid-19 e qualità dell'aria nel Bacino Padano / aggiornamento maggio 2020

Impatto delle misure di contenimento Covid-19 sulle emissioni di PM_{10} e NO_x

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

Covid-19 e qualità dell'aria nel Bacino Padano

Effetti delle misure di contenimento Covid -19 sui principali settori emissivi

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

Covid-19 e qualità dell'aria nel Bacino Padano / aggiornamento maggio 2020

Considerazioni e prime conclusioni

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

emissioni NO_x
max - **40%** *

emissioni PM₁₀
max - **21%** *

Risultato importante.
Sarà sufficiente per
rispettare i valori limite UE ?

* riduzione massima media dell'intero bacino Bacino Padano

Variazioni settimanali di alcuni indicatori relativi ad attività antropiche rilevanti per la qualità dell'aria. Dall'alto: traffico su strade urbane, extra-urbane e autostrade; in fondo: traffico aereo.

Riduzioni settimanali delle emissioni antropogeniche delle principali specie chimiche inquinanti e climalteranti in Friuli Venezia Giulia.

Andamento delle concentrazioni aria ambiente dei principali inquinanti, nel periodo febbraio–maggio 2020. Mediane giornaliere regionali in Friuli Venezia Giulia, confrontate con lo stesso periodo degli anni precedenti.

Andamento del rapporto toluene/benzene nel periodo febbraio–aprile 2020. Mediane giornaliere confrontate con gli anni precedenti.

Andamento della percentuale di polveri grossolane nel PM10 nel periodo febbraio–aprile 2020. Medie giornaliere, confronti tra stazioni dell’area pordenonese.

Principal Component Analysis degli Idrocarburi Policiclici Aromatici a Udine (azzurro), Tolmezzo (nero) e Ugovizza (rosso).

- http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/tecnico_scientifiche_docs/Report_Lockdown_ARPAFVG_Approvato.pdf
- https://www.lifeprepare.eu/wp-content/uploads/2020/06/COVIDQA-Prepair-19Giugno2020_final.pdf

Grazie per l'attenzione!

- Allwine, K. J. and Whiteman, C. D. (1994).
Single-station integral measures of atmospheric stagnation, recirculation and ventilation.
Atmospheric Environment, 28(4):713–721.
- ARPA-FVG (2020).
Effetti sulla matrice ambientale ARIA delle azioni di contenimento del COVID-19. Relazione tecnica.
- De Reu, J., Bourgeois, J., Bats, M., Zwertvaegher, A., Gelorini, V., De Smedt, P., Chu, W., Antrop, M., De Maeyer, P., Finke, P., et al. (2013).
Application of the topographic position index to heterogeneous landscapes.
Geomorphology, 186:39–49.
- Miranda, A., Silveira, C., Ferreira, J., Monteiro, A., Lopes, D., Relvas, H., Roebeling, P., Borrego, C., Turrini, E., and Volta, M. (2014).
Urban air quality plans in europe: a review on applied methodologies.
Air Pollution XXII, 183:315.
- Pasch, A. N., MacDonald, C. P., Gilliam, R. C., Knoderer, C. A., and Roberts, P. T. (2011).
Meteorological characteristics associated with PM_{2.5} air pollution in Cleveland, Ohio, during the 2009–2010 Cleveland Multiple Air Pollutants Study.
Atmospheric environment, 45(39):7026–7035.
- Pérez, N., Rodríguez, G., and Pacheco, J. (2014).
Atmospheric recirculation on the east coast of Gran Canaria Island.
Proceedings of Air Pollution XXII, 183:15–25.
- Seinfeld, J. H. and Pandis, S. N. (2016).
Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change.
John Wiley & Sons.
- The PREPAIR team (2020).
Studio preliminare degli effetti delle misure COVID-19 sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell'aria nel bacino padano.
- Wu, M., Wu, D., Fan, Q., Wang, B., Li, H., and Fan, S. (2013).
Observational studies of the meteorological characteristics associated with poor air quality over the Pearl River Delta in China.
Atmospheric Chemistry and Physics, 13(21):10755–10766.