

***FLAVOPARMELIA CAPERATA***  
**(L.) HALE**



## **Caratteri morfologici**

- Tallo folioso a lobi larghi, verde giallastro.
- Lobi ampi 6-10 mm, allungati, appiattiti, contingui, appressati al substrato, con margini arrotondati.
- Soredi diffusi, granulari, verde giallastri. Sorali laminari.
- Superficie inferiore del tallo nera, marrone al margine.
- Rizine nere, semplici, abbondanti ai margini.
- Apoteci rari, lecanorini, sessili. Disco marrone.
- Fotobionte clorococcoide.

## **Caratteri chimici**

- Tallo K+ giallo, C-, KC+ giallo, P-.
- Medulla K-, C-, KC+ rosso, P+ arancione.

## **Caratteri ecologici**

- Lichene mesofitico particolarmente diffuso nella fascia submediterranea su alberi decidui isolati.
- Predilige substrati da moderatamente acidi a subacidi, tollera radiazione solare diretta e livelli di eutrofizzazione anche moderatamente pronunciati.
- In provincia di Trieste è molto frequente soprattutto sul Carso e riesce a penetrare nel tessuto urbano.

## **Specie simili**

- *Flavoparmelia soredians*: differisce per la medulla che è K+ giallo virante poi al rosso. I soredi inoltre sono farinosi, prominenti e distribuiti su tutto il tallo.